

レジメン番号	0017	レジメン名	リツキサン維持療法
登録診療科	血液・腫瘍内科	使用薬剤	リツキサン/リツキシマブ BS
がん腫	悪性リンパ腫	インターバル日数	56 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	・・・Day56	Day1 ( / )
リツキサン/リツキシマブ BS 375 mg/m <sup>2</sup>	点滴		↓	8週を1コースとして 12コース繰り返す	↓

(支持療法)

※1 経口剤あり

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①リツキサン	100mg	生食で10倍希釈	※2 下記参照/輸注ポンプ
	500mg		
②5%ブドウ糖液	500ml		メインルート/点滴

投与間隔>

(メインルート)

(※2 指示通り/側管)

投与順番>

②

→

①

→

終了

【備考】

※1 解熱鎮痛剤及び抗ヒスタミン剤の予防投与を行う

※2 初回投与時は、最初の30分は50mg/時の速度で点滴静注を開始し、患者の状態を十分観察しながら、

その後注入速度を30分毎に50mg/時ずつ上げて、最大400mg/時まで速度を上げることができる。

また、2回目以降の注入開始速度は、初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合、100mg/時まで上げて

開始し、その後30分毎に100mg/時ずつ上げて、最大400mg/時まで上げることができる。