

レジメン番号	0028	レジメン名	DBd 療法 9 サイクル以降
登録診療科	血液・腫瘍内科	使用薬剤	ダラザレックス、ベルケイド デキサート/レナデックス
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】


薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day28	Day1 (/)
ダラザレックス 16mg/kg	点滴	mg	↓	4 週間を 1 コース	↓
デキサメタゾン 40mg ※1 点滴 33.3mg 経口 40mg 医師の判断で実施	点滴 又は 経口	mg	(↑)		(↑)

(支持療法)

※2 Day1 経口剤あり

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① ダラザレックス	100mg 400mg	生食 500ml	※3 下記参照/輸注ポンプ
② デキサート	3.3mg	生食 100ml	15 分/点滴
③ 生食	500ml		メインルート/持続 50ml/h



②は①投与 1～3 時間前までに投与終了

【備考】

※1 75 歳を超える、過少体重 (BMI : 18.5kg/m²未満)、コントロール不良の糖尿病又はステロイド療法に

対する忍容性がない、もしくは有害事象を発現した患者には、デキサメタゾン を 20mg/週で投与可

※2 ダラザレックス投与 1～3 時間前に、解熱鎮痛剤 (アセアミノフェン 1000mg) 及び抗ヒスタミン剤の予防投与を行う

※3 ダラザレックス投与速度

投与時期	希釈後の総量	投与開始からの投与速度 (ml/h)			
		0～1 時間	1～2 時間	2～3 時間	3 時間以降
3 回目投与以降	500ml	100 ^{注1}	150	200	

注：初回及び 2 回目投与時に最終速度が 100ml/h 以上で infusion reaction が認められなかった場合、100ml/h から開始することができる。