レジメン番号	0043	**レジメン名**	A+AVD 療法
登録診療科	血液内科	**使用薬剤**	アドセトリス、ドキソルビシン、 エクザール、ダカルバジン
がん腫	ホジキンリンパ腫	**インターバル日数**	14 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	**患者 投与量**	Day1 (/)	･･･Day14	Day1 (/)
ドキソルビシン(ADR) 25mg/m²/日	点滴	**mg**	↓	2 週間を 1 コース	↓
エクザール(VBL) 6mg/m²/日	点滴	**mg**	↓		↓
ダカルバジン(DTIC) 375mg/m²/日	点滴	**mg**	↓		↓
アドセトリス 1.2mg/kg/日	点滴	**mg**	↓		↓
(支持療法)					
A)アロキシ(0.75) **B)グラニセトロン（1)**	点滴	◯ **を mg**	↑	2 週間を 1 コース	↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ドキソルビシン	10mg 50mg	生食 100mL	30 分/点滴
② エクザール	10mg	生食 50mL	5 分/点滴
③ ダカルバジン	100mg	生食 100mL	30 分/点滴
④ アドセトリス	50mg	生食 100mL	30 分/点滴
⑤ 注射用蒸留水	100mL		ｱﾄﾞｾﾄﾘｽ溶解用
⑥ アロキシ / グラニセトロン **または**	0.75mg 1mg	生食 100mL	15 分/点滴
⑦ 生食	50mL		5 分/点滴
⑧ 生食	500mL		メインルート/点滴

投与間隔≫			側管		側管		側管		側管		側管		側管		
	ﾒｲﾝﾙｰﾄ		15 分		30 分		5 分		30 分		5 分		30 分		
投与順番≫	⑧	→	⑥	→	①	→	②	→	③	→	⑦	→	④	→	終了

【備考】