

| | | | |
|--------|---------|----------|-------------------------------------|
| レジメン番号 | 0052 | レジメン名 | DVMP 2-9 コース目 |
| 登録診療科 | 血液・腫瘍内科 | 使用薬剤 | ダラザレックス、ベルケイド、アルケラン デキサート/プレドニゾン |
| がん腫 | 多発性骨髄腫 | インターバル日数 | 42 日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | Day2 (/) | Day3 (/) | Day4 (/) | Day8 (/) | Day22 (/) | Day29 (/) | …Day42 |
|-------------------------------|------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| ダラザレックス 16mg/kg | 点滴 | mg | ↓ | | | | | ↓ | | 6 週間を 1 コース |
| ベルケイド 1.3mg/m ² | 皮下注 | mg | ↓ | | | | ↓ | ↓ | ↓ | |
| デキサート 16.5mg/body | 点滴 | mg | ↓ | | | | | ↓ | | |
| プレドニゾン 60mg/m ² | 経口 | mg | | ↓ | ↓ | ↓ | | | | |
| アルケラン 9mg/m ² | 経口 | mg | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | |

(支持療法)

※1 Day1,22 経口剤あり

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|-----------|-------|----------|---------------|
| ① ダラザレックス | 100mg | 生食 500mL | ※2 下記参照/輸注ポンプ |
| | 400mg | | |
| ② ベルケイド | 3mg | 生食 1.2mL | 皮下注 |
| ③ デキサート | 3.3mg | 生食 100ml | 15 分/点滴 |
| ④ 生食 | 500mL | | (メインポート/持続) |

(Day1,22)

投与間隔>

(メインポート/持続)

(側管 15 分)

(皮下注)

(側管※2)

投与順番> ④ → ③ → ② → ① → 終了

(Day8,29)

投与間隔>

(皮下注)

投与順番> ① → 終了

【備考】

※1 ダラザレックス投与 1～3 時間前に、解熱鎮痛剤 (アセアミノフェン 1000mg) 及び抗ヒスタミン剤の予防投与を行う

※2 ダラザレックス投与速度

| 投与時期 | 希釈後の総量 | 投与開始からの投与速度 (ml/h) | | | |
|----------|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| | | 0～1 時間 | 1～2 時間 | 2～3 時間 | 3 時間以降 |
| 初回投与 | 1000ml | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 2 回目投与 | 500ml ^{注1} | | | | |
| 3 回目投与以降 | 500ml | 100 ^{注2} | 150 | 200 | |

注 1 : 初回投与開始時から 3 時間以内に infusion reaction が認められなかった場合、500mL とすることができる。

注 2 : 初回及び 2 回目投与時に最終速度が 100mL/h 以上で infusion reaction が認められなかった場合、100mL/h から開始することができる。