

レジメン番号	0081	レジメン名	CBDCA+nab-PTX
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチン、アブラキサン
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	・ ・ Day21	Day1 (/)
アブラキサン(nab-PTX) 100mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	3週間を1コース	↓
カルボプラチン (CBDCA) (AUC=6 : Calvert 式)	点滴	mg	↓				↓

(支持療法)

薬品名	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	・ ・ Day21	Day1 (/)
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑	3週間を1コース	↑
A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○ mg	↑				↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	mg		↑	↑		
プロイメンド 150mg/body	点滴	mg	↑				

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①アブラキサン	100mg	生食 100mL	30分/点滴
②カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
③ プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴
④ アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	生食 100ml	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
⑤ グラニセトロン デキサート	1mg	生食 100mL	15分/点滴
	3.3mg		
⑥ 生食	50ml		5分/点滴

(day1)

投与間隔>

(30分) (15分) (5分) (30分) (5分) (60分) (5分)

投与順番> ③ → ④ → ⑥ → ① → ⑥ → ② → ⑥ → 終了

(day8、15)

投与間隔>

(15分) (5分) (30分) (5分)

投与順番> ⑤ → ⑥ → ① → ⑥ → 終了

【備考】

③プロイメンド：内服イメンド（day1 125mg、day2以降80mg）使用の場合は投与しない