

レジメン番号	0103	レジメン名	CBDCA+nab-PTX+ペムブロリズマブ
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチン、アブラキサン、キイトルーダ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
キイトルーダ 200mg/body	点滴	mg	↓			3週間を1コース	↓
アブラキサン(nab-PTX) 100mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓		↓
カルボプラチン (CBDCA) (AUC=6 : Calvert 式)	点滴	mg	↓				↓

(支持療法)

アロキシ 0.75mg/body	点滴	mg	↑			3週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	↑				↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	mg		↑	↑		
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg		↑	↑		

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①キイトルーダ	100mg	生食 100mL	30分/点滴
②アブラキサン	100mg	生食 100mL	30分/点滴
③カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
④	アロキシ 0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	デキサート 3.3mg		
⑤	グラニセトロン 1mg	生食 100mL	15分/点滴
	デキサート 3.3mg		
⑥	生食	100mL	15分/点滴
⑦	生食	50mL	5分/点滴
⑧	生食	50mL	5分/点滴
⑨	生食	50mL	5分/点滴
⑩	生食	50mL	5分/点滴

(day1)

投与間隔> (15分) (30分) (5分) (15分) (5分) (30分) (5分) (60分) (5分)

投与順番> ⑥ → ① → ⑦ → ④ → ⑧ → ② → ⑨ → ③ → ⑩ → 終了

(day8、15)

投与間隔> (15分) (5分) (30分) (5分)

投与順番> ⑤ → ⑦ → ② → ⑧ → 終了

【備考】

・内服イメンド (day1 125mg、day2 以降 80mg)、またはプロイメンド 150mg を併用する