

|        |        |          |                       |
|--------|--------|----------|-----------------------|
| レジメン番号 | 0117   | レジメン名    | CBDCA+nab-PTX+アテゾリズマブ |
| 登録診療科  | 呼吸器内科  | 使用薬剤     | カルボプラチン、アブラキサン、テセントリク |
| がん腫    | 非小細胞肺癌 | インターバル日数 | 21日                   |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名<br>投与量/体表面積                         | 投与方法 | 患者投与量 | Day1<br>( / ) | Day8<br>( / ) | Day15<br>( / ) | …Day21   | Day1<br>( / ) |
|---|------|-------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| テセントリク<br>1200mg/body                   | 点滴   | mg    | ↓             |               |                | 3週間を1コース | ↓             |
| アブラキサン(nab-PTX)<br>100mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | mg    | ↓             | ↓             | ↓              |          | ↓             |
| カルボプラチン (CBDCA)<br>(AUC=6 : Calvert 式)  | 点滴   | mg    | ↓             |               |                |          | ↓             |


(支持療法)

|                      |    |        |   |   |   |          |   |
|----------------------|----|--------|---|---|---|----------|---|
| アロキシ<br>0.75mg/body  | 点滴 | 0.75mg | ↑ |   |   | 3週間を1コース | ↑ |
| デキサート<br>9.9mg/body  | 点滴 | 9.9mg  | ↑ |   |   |          | ↑ |
| グラニセトロン<br>1mg/body  | 点滴 | 1mg    |   | ↑ | ↑ |          |   |
| デキサート<br>6.6mg/body  | 点滴 | 6.6mg  |   | ↑ | ↑ |          |   |
| プロイメンド<br>150mg/body | 点滴 | 150mg  | ↑ |   |   |          | ↑ |


【当日の投与方法】

| 薬品名      | 規格             | 希釈液/量    | 投与速度/方法    |
|----------|----------------|----------|------------|
| ①テセントリク  | 1200mg         | 生食 250mL | ※1 下記参照/点滴 |
| ②アブラキサン  | 100mg          | 生食 100mL | 30分/点滴     |
| ③カルボプラチン | 50mg           | 生食 250mL | 60分/点滴     |
|          | 150mg          |          |            |
| ④        | アロキシ<br>0.75mg | 生食 100mL | 15分/点滴     |
|          | デキサート<br>3.3mg |          |            |
| ⑤        | グラニセトロン<br>1mg | 生食 100mL | 15分/点滴     |
|          | デキサート<br>3.3mg |          |            |
| ⑥プロイメンド  | 150mg          | 生食 250mL | 30分/点滴     |
| ⑦生食      | 100mL          |          | 15分/点滴     |
| ⑧生食      | 50mL           |          | 5分/点滴      |

(day1)



(day8、15)



【備考】

⑥プロイメンド：内服イメンド (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない

※1 テセントリク投与速度 初回 60分/2回目以降 30分まで短縮可能