


レジメン番号	0138	レジメン名	FOLFIRINOX
登録診療科	消化器外科	使用薬剤	フルオロウラシル、レボホリナート、トポテシン、エルプラット
がん腫	膵癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】


薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day14	Day1 (/)
レボホリナート(1-LV) 200mg/ m ²	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
エルプラット(1-OHP) 85mg/ m ²	点滴	mg	↓		↓
トポテシン(CPT-11) 180mg/ m ²	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル 400mg/ m ²	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル 2400mg/ m ²	持続注入	mg	↓		↓

(支持療法)

A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	 mg	↑	2週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①レボホリナート	25mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
	100mg		
②エルプラット	100mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
③トポテシン	40mg	5%ブドウ糖液 250mL	90分/点滴
	100mg		
④フルオロウラシル	250mg	5%ブドウ糖液 100mL	5分/点滴
⑤フルオロウラシル	250mg	生食適量	46hr 持続注入
	1000mg		
⑥ アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	5%ブドウ糖液 100mL	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		



【備考】

※プロイメンド又は内服イメンドを併用する