

レジメン番号	0141	レジメン名	GCS
登録診療科	消化器外科	使用薬剤	ジェムザール、シスプラチン、 エスワンタイホウ
がん腫	胆道癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2~7	…Day14	Day1 (/)
シスプラチン(CDDP) 25mg/m ²	点滴	mg	↓		2週間を1コース	↓
ジェムザール(GEM) 1000mg/m ²	点滴	mg	↓			↓
エスワンタイホウ(S-1) ※下記参照	内服	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

薬品名	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2~7	…Day14	Day1 (/)
A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑		2週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑			↑
硫酸マグネシウム 8mEq/body	点滴		↑			↑
ラシックス 10mg/body	点滴	mg	↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①シスプラチン	10mg	生食 400ml	60分/点滴
	25mg		
	50mg		
②ジェムザール	200mg	生食 100ml	30分/点滴
	1000mg		
③ アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	生食 100ml	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
④硫酸マグネシウム		生食 500ml	60分/点滴
⑤ラシックス	20mg	生食 250ml	30分/点滴
⑥生食	500mL		60分/点滴

投与間隔>> (15分) (30分) (60分) (30分) (60分) (60分)
 投与順番>> ③ → ② → ④ → ⑤ → ① → ⑥ → 終了

【備考】

・ S-1 内服を Day1~Day7 に併用 (1週服薬 1週休薬)

※S-1 投与量 : BSA 1.25 m²未満 → 80mg/day

BSA 1.25 m²~1.5 m²未満 → 100mg/day

BSA 1.5 m²以上 → 120mg/day