

|        |       |          |                 |
|--------|-------|----------|-----------------|
| レジメン番号 | 0157  | レジメン名    | SOX             |
| 登録診療科  | 消化器外科 | 使用薬剤     | エスワンタイホウ、エルプラット |
| がん腫    | 胃癌    | インターバル日数 | 21日             |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名<br>投与量/体表面積                        | 投与方法 | 患者投与量 | Day1<br>( / ) | Day2~14 | ...Day21 | Day1<br>( / ) |
|--|------|-------|---------------|---------|----------|---------------|
| エルプラット(1-OHP)<br>100mg/ m <sup>2</sup> | 点滴   | mg    | ↓             |         | 3週間を1コース | ↓             |
| エスワンタイホウ(S-1)<br>※下記参照                 | 内服   | mg    | ↓             | ↓       |          | ↓             |

(支持療法)

|                                |    |    |   |  |  |   |
|--------------------------------|----|----|---|--|--|---|
| A) アロキシ(0.75)<br>B) グラニセトロン(1) | 点滴 | mg | ↑ |  |  | ↑ |
| デキサート<br>6.6mg/body            | 点滴 | mg | ↑ |  |  | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 |                | 規格     | 希釈液/量         | 投与速度/方法 |
|-----|----------------|--------|---------------|---------|
| ①   | エルプラット         | 100mg  | 5%ブドウ糖液 500mL | 120分/点滴 |
|     | デキサート          | 1.65mg |               |         |
| ②   | アロキシ           | 0.75mg | 5%ブドウ糖液 100mL | 15分/点滴  |
|     | または<br>グラニセトロン | 3mg    |               |         |
|     | デキサート          | 3.3mg  |               |         |
|     |                | 1.65mg |               |         |
| ③   | 生食             | 50ml   |               | 5分/点滴   |

投与間隔≫ (15分) (120分) (5分)

投与順番≫ ② → ① → ③ → 終了

【備考】

S-1 内服を Day1~Day14 に併用 (2週服薬 1週休薬)

※ S-1 投与量 : BSA 1.25 m<sup>2</sup>未満 → 80mg/day

BSA 1.25 m<sup>2</sup>~1.5 m<sup>2</sup>未満 → 100mg/day

BSA 1.5 m<sup>2</sup>以上 → 120mg/day