

レジメン番号	0177	レジメン名	AVASTIN+FOLFIRI
登録診療科	消化器外科	使用薬剤	アバスタチン、レボホリナート、フルオロウラシル、トポテシン
がん腫	大腸癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】


薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	…Day14	Day1 ( / )
レボホリナート (1-LV) 200mg/ m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
フルオロウラシル (5FU) 400mg/ m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		↓
トポテシン(CPT-11) 150mg/ m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル (5FU) 2400mg/ m <sup>2</sup>	持続注入	mg	↓		↓
アバスタチン(Bev) 5mg/ kg	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑	2週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① レボホリナート	25mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
	100mg		
② フルオロウラシル	250mg	生食 50mL	5分/点滴
	1000mg		
③ フルオロウラシル	250mg	生食適量	46hr 持続注入
	1000mg		
④ トポテシン	40mg	5%ブドウ糖液 250mL	90分/点滴
	100mg		
⑤ アバスタチン	100mg	生食 100mL	下記参照/点滴
	400mg		
⑥ アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	5%ブドウ糖液 100mL	30分/点滴
	1mg		
	3.3mg		



【備考】

⑤アバスタチン 初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分