


レジメン番号	0179	レジメン名	AVASTIN+sLV5FU
登録診療科	消化器外科	使用薬剤	アバスチン、レボホリナート、フルオロウラシル
がん腫	大腸癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day14	Day1 (/)
アバスチン(Bev) 5mg/kg	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
レボホリナート(1-LV) 200mg/ m ² /日	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル(5FU) 400mg/ m ² /日	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル(5FU) 2400mg/ m ² /日 (支持療法)	持続 注入	mg	↓		↓
A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑	2週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①アバスチン	100mg	生食 100mL	※
	400mg		
②レボホリナート	25mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
	100mg		
③ フルオロウラシル	250mg	生食 50mL	全開/点滴
③ フルオロウラシル	250mg	生食適量	46hr 持続注入
④ アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	生食 100mL	30分/点滴
	1mg		
	3.3mg		



【備考】

※ アバスチン 初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分で投与可能。