

レジメン番号	0187	レジメン名	SIRB
登録診療科	消化器外科	使用薬剤	エスワンタイホウ、トポテシン、アバスチン
がん腫	大腸癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2~14	・・・Day21	Day1 (/)
トポテシン(CPT-11) 150mg/m ²	点滴	mg	↓		3週間を1コース	↓
アバスチン(Bev) 7.5mg/kg	点滴	mg	↓			↓
エスワンタイホウ(S-1) ※1 下記参照	内服	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑		3週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①トポテシン	40mg	5%ブドウ糖液 250mL	90分/点滴
	100mg		
②アバスチン	100mg	生食 100 mL	※2 下記参照
	400mg		
③	アロキシ	5%ブドウ糖液 100mL	15分/点滴
	または グラニセトロン		
	デキサート		

投与間隔>> (※2 下記参照) (15分) (90分)
 投与順番>> ② → ③ → ① → 終了

【備考】

S-1 内服を Day1~Day14 に併用 (2週服薬 1週休薬)

※1 S-1 投与量 : BSA 1.25 m²未満 → 80mg/day

BSA 1.25 m²~1.5 m²未満 → 100mg/day

BSA 1.5 m²以上 → 120mg/day

※2 アバスチン 初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分