| レジメン番号 | 0192 | レジメン名 | SOX [ポート] |
|--------|-------|----------|-----------------|
| 登録診療科 | 消化器外科 | 使用薬剤 | エルプラット、エスワンタイホウ |
| がん腫 | 大腸癌 | インターバル日数 | 21 日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与 方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | Day2~14 | Day21 | Day1 (/) |
|--|----------|-------|------------|----------|-------------|------------|
| エルプラット(1-OHP) 130mg/ m ² | 点滴 | mg | ↓ | | 0.78.88.4 | ↓ |
| エスワンタイホウ (S-1) ※下記参照 | 内服 | mg | ↓ | <u> </u> | 3 週間を 1 コース | ↓ |

(支持療法)

| A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1) | 点滴 | mg | 1 | 3 週間を 1 コース | ↑ |
|------------------------------|----|----|----------|-------------|----------|
| デキサート 6.6mg/body | 点滴 | mg | ↑ | 3 週間で 1 コーハ | ↑ |

【当日の投与方法】

| | 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 | |
|----|---------|--------|---------------|----------|--|
| ①: | エルプラット | 100mg | 5%ブドウ糖液 500mL | 120 分/点滴 | |
| | アロキシまたは | 0.75mg | | | |
| 2 | グラニセトロン | 1mg | 5%ブドウ糖液 100mL | 30 分/点滴 | |
| | デキサート | 3.3mg | | | |

| 投与間隔≫ | | (30分) | | (120分) | | |
|-------|-----|----------|-----|----------|----|--|
| 投与順番≫ | (2) | → | (1) | → | 終了 | |

【備考】

| S-1 内服を Day1~Day14 に併用(2 週服薬 1 週休薬) | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| | 80mg/day | | | | |
| BSA 1.25 ㎡~1.5 ㎡未満 → | | | | | |
| BSA 1.5 ㎡以上 → | 120mg/day | | | | |
| | | | | | |