

| | | | |
|--------|-------|----------|---------------------------|
| レジメン番号 | 0193 | レジメン名 | Bev+SOX [末梢] |
| 登録診療科 | 消化器外科 | 使用薬剤 | アバスチン、エルプラット、 エスワンタイホウ |
| がん腫 | 大腸癌 | インターバル日数 | 21日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | Day2~14 | …Day21 | Day1 (/) |
|---------------------------------------|------|-------|---------------|---------|----------|---------------|
| アバスチン(Bev) 7.5mg/kg | 点滴 | mg | ↓ | | 3週間を1コース | ↓ |
| エルプラット(l-OHP) 130mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | | | ↓ |
| エスワンタイホウ(S-1) ※1 下記参照 | 内服 | mg | ↓ | ↓ | | ↓ |

(支持療法)

| | | | | | | |
|------------------------------|----|----|---|--|----------|---|
| A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1) | 点滴 | mg | ↑ | | 3週間を1コース | ↑ |
| デキサート 6.6mg/body | 点滴 | mg | ↑ | | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|--------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| ① アバスチン | 100mg | 生食 100ml | ※2 下記参照/点滴 |
| | 400mg | | |
| ② エルプラット デキサート | 100mg | 5%ブドウ糖液 500mL | 120分/点滴 |
| | 1.65mg | | |
| ③ アロキシ または グラニセトロン デキサート | 0.75mg | 5%ブドウ糖液 100mL | 30分/点滴 |
| | 3mg | | |
| | 3.3mg 1.65mg | | |

投与間隔>

(※2 下記参照)

(30分)

(120分)

投与順番>

①

→

③

→

②

→

終了

【備考】

S-1 内服を Day1~Day14 に併用 (2週服薬 1週休薬)

※1 S-1 投与量 : BSA 1.25 m²未満 → 80mg/day

BSA 1.25 m²~1.5 m²未満 → 100mg/day

BSA 1.5 m²以上 → 120mg/day

※2 アバスチン 初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分