

| | | | |
|--------|------|----------|----------------|
| レジメン番号 | 0316 | レジメン名 | dose dense AC |
| 登録診療科 | 乳腺外科 | 使用薬剤 | ドキソルビシン、エンドキサン |
| がん腫 | 乳癌 | インターバル日数 | 14日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | …Day14 | Day1 (/) |
|-------------------------------------|------|-------|---------------|----------|---------------|
| ドキソルビシン(DXR) 60mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | 2週間を1コース | ↓ |
| エンドキサン(CPA) 600mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | | ↓ |
| (支持療法) | | | | | |
| プロイメンド 150mg/body | 点滴 | mg | ↑ | 2週間を1コース | ↑ |
| アロキシ 0.75mg/body | 点滴 | mg | ↑ | | ↑ |
| デキサート 9.9mg/body | 点滴 | mg | ↑ | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|----------|----------------|----------|---------|
| ①ドキソルビシン | 10mg | 生食 100mL | 10分/点滴 |
| | 50mg | | |
| ②エンドキサン | 100mg | 生食 100mL | 30分/点滴 |
| | 500mg | | |
| ③ | アロキシ 0.75mg | 生食 100mL | 15分/点滴 |
| | デキサート 3.3mg | | |
| ④プロイメンド | 150mg | 生食 250mL | 30分/点滴 |
| ⑤生食 | 50ml | | 5分/点滴 |

投与間隔≫ (30分) (15分) (10分) (30分) (5分)
 投与順番≫ ④ → ③ → ① → ② → ⑤ → 終了

【備考】

Day3にジーラスト投与

④プロイメンド：内服イメンド（day1 125mg、day2以降 80mg）使用の場合は投与しない