

レジメン番号	0205	レジメン名	PAV
登録診療科	脳神経外科	使用薬剤	プロカルバジン、ニドラン、オンコビン
がん腫	悪性神経膠腫	インターバル日数	56日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day8 ( / )	Day8~21 ( / )	Day29 ( / )	…Day56	Day1 ( / )
プロカルバジン 60mg/m <sup>2</sup>	経口	mg			↓		8週間を1コース	
ニドラン(ACNU) 70mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓			↓		
オンコビン(VCR) 1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg		↓		↓		

(支持療法)

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	○ mg	↑				8週間を1コース	↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	mg		↑		↑		
デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	↑		↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① ニドラン	50mg	蒸留水 100mL	15分/点滴
② オンコビン	1mg	生食 100mL	15分/点滴
③ アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg 1mg 3.3mg	生食 100mL	15分/点滴
④ 生食	50mL		5分/点滴

(Day1)

投与間隔≫ (15分) (15分) (5分)  
 投与順番≫ ③ → ① → ④ → 終了

(Day8,29)

投与間隔≫ (15分) (15分) (5分)  
 投与順番≫ ③ → ② → ④ → 終了

【備考】

3~4コース実施が目安で、最大6コースまで。