

レジメン番号	0216	レジメン名	CBDCA+GEM 療法
登録診療科	泌尿器科	使用薬剤	カルボプラチン、ジェムザール
がん腫	尿路上皮癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	患者 投与量	投与 方法	Day1 (/)	Day8 (/)	…Day21	Day1 (/)
ジェムザール 1000mg/m ² /日	mg	点滴	↓	↓	3 週間を 1 コース	↓
カルボプラチン (AUC=4.5 : Calvert 式)	mg	点滴	↓			↓

(支持療法)

デキサート 9.9mg/body	mg	点滴	↑		3 週間を 1 コース	↑
デキサート 6.6mg/body	mg	点滴		↑		
A)アロキシ (0.75) B)グラニセトロン (1)	○ mg	点滴	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ジェムザール	200mg	生食 100mL	30 分/点滴
	1000mg		
②カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60 分/点滴
	150mg		
③	デキサート	生食 100mL	15 分/点滴
	アロキシ		
	グラニセトロン		
④生食	50mL	生食 50mL	5 分/点滴

(Day1)

投与間隔≫ (15 分) (30 分) (60 分) (全開)
 投与順番≫ ③ → ① → ② → ④ → 終了

(Day8)

投与間隔≫ (15 分) (30 分) (全開)
 投与順番≫ ③ → ① → ④ → 終了

【備考】