

|        |      |          |           |
|--------|------|----------|-----------|
| レジメン番号 | 0231 | レジメン名    | CPT11 3&1 |
| 登録診療科  | 婦人科  | 使用薬剤     | トポテシン     |
| がん腫    | 卵巣癌  | インターバル日数 | 28日       |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名<br>投与量/体表面積                       | 患者投与量 | 投与方法 | Day1<br>( / ) | Day8<br>( / ) | Day15<br>( / ) | …Day28   | Day1<br>( / ) |
|---------------------------------------|-------|------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| トポテシン(CPT-11)<br>100mg/m <sup>2</sup> | mg    | 点滴   | ↓             | ↓             | ↓              | 4週間を1コース | ↓             |

(支持療法)

|                              |    |    |   |   |   |          |   |
|------------------------------|----|----|---|---|---|----------|---|
| A)アロキシ(0.75)<br>B)グラニセトロン(1) | mg | 点滴 | ↑ | ↑ | ↑ | 4週間を1コース | ↑ |
| デキサート<br>6.6mg/body          | mg | 点滴 | ↑ | ↑ | ↑ |          | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名                        | 規格     | 希釈液/量    | 投与速度/方法 |
|----------------------------|--------|----------|---------|
| ① トポテシン                    | 40mg   | 生食 250mL | 90分/点滴  |
|                            | 100mg  |          |         |
| ② アロキシ<br>グラニセトロン<br>デキサート | 0.75mg | 生食 100mL | 15分/点滴  |
|                            | 1mg    |          |         |
|                            | 3.3mg  |          |         |

投与間隔≫ (15分) (90分)  
 投与順番≫ ② → ① → 終了

【備考】

4週間を1コースとして6コース繰り返す