

レジメン番号	0257	レジメン名	アバスチン+GEM
登録診療科	婦人科	使用薬剤	アバスチン、ジェムザール
がん腫	卵巣癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	Day1 (/)	Day8 (/)	…Day21	Day1 (/)
アバスチン(Bev) 15mg/kg	点滴	↓		3週間を1コース	↓
ジェムザール (GEM) 1000mg/m ²	点滴	↓	↓		↓

(支持療法)

デキサート 6.6mg/body	点滴	↑	↑	3週間を1コース	↑
グラニセトロン 1 mg/body	点滴	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①アバスチン	100mg	生食 100mL	※下記参照/点滴
	400mg		
②ジェムザール	200mg	生食 100mL	30分/点滴
	1000mg		
③	デキサート 3.3mg	生食 100mL	15分/点滴
	グラニセトロン 1mg		
④ 生食	50mL		5分/点滴

<Day1>

投与間隔≫ (※下記参照) (15分) (30分) (5分)
 投与順番≫ ① → ③ → ② → ④ → 終了

<Day8>

投与間隔≫ (15分) (30分) (5分)
 投与順番≫ ③ → ② → ④ → 終了

【備考】

※ アバスチン 初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分で投与可能。