

|        |      |          |             |
|--------|------|----------|-------------|
| レジメン番号 | 0266 | レジメン名    | CDDP weekly |
| 登録診療科  | 婦人科  | 使用薬剤     | シスプラチン      |
| がん腫    | 子宮頸癌 | インターバル日数 | 7日          |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名<br>投与量/体表面積                     | 投与方法 | 患者投与量 | Day1<br>( / ) | ・・・Day7  | Day1<br>( / ) |
|-------------------------------------|------|-------|---------------|----------|---------------|
| シスプラチン(CDDP)<br>40mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | mg    | ↓             | 1週間を1コース | ↓             |

(支持療法)

|                                |    |       |   |          |   |
|--------------------------------|----|-------|---|----------|---|
| A) アロキシ(0.75)<br>B) グラニセトロン(1) | 点滴 | を     | ↑ | 1週間を1コース | ↑ |
| デキサート<br>6.6mg/body            | 点滴 | 6.6mg | ↑ |          | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名                            | 規格     | 希釈液/量    | 投与速度/方法   |
|--------------------------------|--------|----------|-----------|
| ① シスプラチン                       | 10mg   | 生食 400mL | 120分/点滴   |
|                                | 25mg   |          |           |
|                                | 50mg   |          |           |
| ② アロキシ または<br>グラニセトロン<br>デキサート | 0.75mg | 生食 100mL | 15分/点滴    |
|                                | 1mg    |          |           |
|                                | 3.3mg  |          |           |
| ③ ラクテック                        | 500mL  |          | メインルート/点滴 |

投与間隔≫ (メインルート) (15分/側管) (120分/側管)

投与順番≫ ③ → ② → ① → 終了

【備考】

放射線治療中に6週間連続投与