

レジメン番号	0285	レジメン名	PTX+セツキシマブ
登録診療科	耳鼻いんこう科	使用薬剤	パクリタキセル、アービタックス
がん腫	頭頸部癌	インターバル日数	56 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	Day22 (/)	Day29 (/)	Day36 (/)	Day43 (/)	Day50 (/)	… Day56	Day1 (/)
パクリタキセル(PTX) 80mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓
アービタックス(Cetuximab) 初回 400mg/ m ² 以降 250mg/ m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

(支持療法)

デキサート 9.9mg/body(1 コース Day1) 6.6mg/body(1 コース目 Day8 以降・2 コース目以降)	点滴	mg	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑	↑	↑	↑	↑	↑				↑
ネオレスター ^ル 10mg/body	点滴	10mg	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑	↑	↑	↑	↑	↑				↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量				投与速度/方法				
①	パクリタキセル	30mg 100mg	生食 250mL				60 分/点滴				
②	アービタックス	100mg	生食 450mL(初回)				下記参照				
③			生食 250mL(以降)								
③	デキサート	1 コース目 Day1 1 コース目 Day8 以降 2 コース目以降	3.3mg	生食 100mL				15 分/点滴			
	ファモチジン	10mg									
	ネオレスター ^ル	3.3mg									
④	グラニセトロン	1mg	生食 100mL				30 分/点滴				
⑤	生食	100mL					30 分/点滴				
⑥	生食	250mL					60 分/点滴				
⑦	生食	50mL					5 分/点滴				

(Day1,8,15,22,29,36)

投与間隔》 (15 分) (30 分) (下記参照) (60 分) (60 分) (5 分)
投与順番》 ③ → ④ → ② → ⑥ → ① → ⑦ → 終了

(Day43,50)

投与間隔》 (15 分) (30 分) (下記参照) (5 分)
投与順番》 ③ → ⑤ → ② → ⑦ → 終了

【備考】

②アービタックス投与速度：初回 120 分／2 回目以降 60 分まで短縮可能