

レジメン番号	0288	レジメン名	EC
登録診療科	乳腺外科	使用薬剤	エピルビシン、エンドキサン
がん腫	乳癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
エピルビシン(EPI) 90mg/m ²	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
エンドキサン(CPA) 600mg/m ²					↓

(支持療法)

プロイメント 150mg/body	点滴	mg	↑	3週間を1コース	↑
A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑		↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①エピルビシン	10mg	生食 100mL	10分/点滴
	50mg		
②エンドキサン	100mg	生食 100mL	30分/点滴
	500mg		
③ アロキシ グラニセトロン または デキサート	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		
④プロイメント	150mg	生食 250mL	30分/点滴
⑤生食	50ml		5分/点滴

投与間隔》 (30分) (15分) (10分) (30分) (5分)
 投与順番》 ④ → ③ → ① → ② → ⑤ → 終了

【備考】

④プロイメント：内服イメント (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない