

レジメン番号	0160	レジメン名	サイラムザ+PTXweekly
登録診療科	消化器外科	使用薬剤	サイラムザ、パクリタキセル
がん腫	胃癌	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day 8 (/)	Day 15 (/)	…Day28	Day1 (/)
パクリタキセル(PTX) 80mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	4週間を1コース	↓
サイラムザ 8mg/kg	点滴	mg	↓		↓		↓

(支持療法)

デキサート 初回 9.9mg/body 2回目以降 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑	4週間を1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①サイラムザ		100mg	生食 250mL	※1 下記参照/点滴
		500mg		
②パクリタキセル		30mg	生食 250mL	60分/点滴
		100mg		
③	デキサート	3.3mg	生食 100mL	15分/点滴
	ファモチジン			
	ネオレスタール	10mg		
④グラニセトロン		1mg	生食 100mL	30分/点滴
⑤生食		250mL		60分/点滴
⑥生食		50mL		5分/点滴

(Day1,15)

投与間隔>> (15分) (30分) (※1 下記参照) (60分) (60分) (5分)

投与順番>> ③ → ④ → ① → ⑤ → ② → ⑥ → 終了

(Day8)

投与間隔>> (15分) (30分) (60分) (5分)

投与順番>> ③ → ④ → ② → ⑥ → 終了

【備考】

サイラムザ投与後の⑤生食(250mL)は1・2コース目のみ(3コース以降は不要)

※1 サイラムザ投与速度：初回 60分、2回目以降 30分まで短縮可能