

レジメン番号	0198	レジメン名	サイラムザ+FOLFIRI
登録診療科	消化器外科	使用薬剤	サイラムザ、フルオロウラシル、レボホリナート、トポテシン
がん腫	大腸癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day14	Day1 (/)
レボホリナート(1-LV) 200mg/ m ²	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
フルオロウラシル (5FU) 400mg/ m ²	点滴	mg	↓		↓
トポテシン(CPT-11) 150mg/ m ²	点滴	mg	↓		↓
フルオロウラシル (5FU) 2400mg/ m ²	持続注入	mg	↓		↓
サイラムザ 8mg/kg	点滴	mg	↓		↓
(支持療法)					
A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑	2週間を1コース	↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	mg	↑		↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①レボホリナート	25mg	5%ブドウ糖液 250mL	120分/点滴
	100mg		
② フルオロウラシル	250mg	生食 50mL	5分/点滴
	1000mg		
②' フルオロウラシル	250mg	生食適量	46hr 持続注入
	1000mg		
③トポテシン	40mg	5%ブドウ糖液 250mL	90分/点滴
	100mg		
④サイラムザ	100mg	生食 250mL	※1 下記参照/点滴
	500mg		
⑤	アロキシ	生食 100mL	15分/点滴
	グラニセトロン		
	ネオレスタール		
	デキサート		
⑥生食	50ml		5分/点滴

投与間隔≫ (15分) (※1 下記参照) (5分) ③ (90分) (5分) 46時間 (持続注入)
(120分)

投与順番≫ ⑤ → ④ → ⑥ → ① → ② → ②' → 終了

【備考】

※1 サイラムザ投与速度：初回 60分、2回目以降 30分まで短縮可能