| レジメン番号 | 0355 | レジメン名 | CBDCA+PTX 療法 |
|---|---|---|---|
| 登録診療科 | 泌尿器科 | 使用薬剤 | パクリタキセル、カルボプラチン |
| がん腫 | 前立腺癌 | インターバル日数 | 21 日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名<br>投与量／体表面積 | 投与<br>方法 | 患者投与量 | Day1<br>( / ) | ･･･21 | Day1<br>( / ) |
|---|---|---|---|---|---|
| パクリタキセル(PTX)<br>175mg/m² | 点滴 | mg | ↓ | 3 週 1 コース | ↓ |
| カルボプラチン(CBDCA)<br>(AUC=5：Calvert 式) | 点滴 | mg | ↓ | | ↓ |

（支持療法）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| デキサート<br>19.8mg/body | 点滴 | 19.8mg | ↑ | | ↑ |
| ファモチジン<br>20mg/body | 点滴 | 20mg | ↑ | | ↑ |
| ネオレスタール<br>10mg/body | 点滴 | 10mg | ↑ | | ↑ |
| グラニセトロン(1mg) | 点滴 | 1mg | ↑ | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|---|---|---|---|---|
| ①パクリタキセル | | 30mg<br>100mg | 生食 500mL | 180 分/点滴 |
| ②カルボプラチン | | 50mg<br>150mg | 生食 250mL | 60 分/点滴 |
| ③ | デキサート | 3.3mg | 生食 100mL | 15 分/点滴 |
| | ファモチジン | 20mg | | |
| | ネオレスタール | 10mg | | |
| ④ | グラニセトロン | 1mg | 生食 100mL | 30 分/点滴 |
| ⑤ | 生食 | 50mL | | 5 分/点滴 |

投与間隔≫ (15 分) (30 分) (180 分) (60 分) (5 分)

投与順番≫ ③ → ④ → ① → ② → ⑤ → 終了

【コメント】