

レジメン番号	0004	レジメン名	ABVD
登録診療科	血液・腫瘍内科	使用薬剤	ドキソルビシン、ブレオ エクザール、ダカルバジン
がん腫	ホジキンリンパ腫	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	患者 投与量	投与 方法	Day1 (/)	Day15 (/)	…28	Day1 (/)
ドキソルビシン(ADR) 25mg/m ² /日	mg	点滴	↓	↓	4週間を1コース	↓
ブレオ(BLM) 10mg/m ² /日	mg	点滴	↓	↓		↓
エクザール(VBL) 6mg/m ² /日	mg	点滴	↓	↓		↓
ダカルバジン(DTIC) 375mg/m ² /日	mg	点滴	↓	↓		↓

(支持療法)

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	○ mg	点滴	↑	↑	4週間を1コース	↑
ヒドロコルチゾン 100mg/body/日	mg	点滴	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ドキソルビシン	10mg	生食 100mL	30分/点滴
	50mg		
②ブレオ	5mg	生食 100mL	30分/点滴
	15mg		
③エクザール	10mg	生食 50mL	全開/点滴
④ダカルバジン	100mg	生食 100mL	30分/点滴
⑤ アロキシ または グラニセトロン	0.75mg	生食 100mL	30分/点滴
	1mg		
⑥ヒドロコルチゾン	100mg	②の生食に混注	

投与間隔≫ (メインルート/持続) (側管 30分) (側管 30分) (側管全開) (側管 30分) (側管 30分)

投与順番≫ ⑦ → ⑤ → ① → ③ → ② ⑥ → ④ → 終了

【備考】

⑦メインルート : KN3号 500mL