

レジメン番号	0361	レジメン名	C-MOPP
登録診療科	血液・腫瘍内科	使用薬剤	エンドキサン、オンコビン、 プレドニゾロン、塩酸プロカルバジン
がん腫	ホジキンリンパ腫	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day14 (/)	…Day28	Day1 (/)	
エンドキサン(CPA) 650mg/m ² /日	点滴	mg	↓	↓		4週を1コースとして繰り返す	↓	
オンコビン(VCR) 1.4mg/m ² /日(最大2mg/body/日)	点滴	mg	↓	↓			↓	
プレドニゾロン(PSL) 40mg/m ² /日 ※1	経口	mg	Day1~14まで 服用					↓
塩酸プロカルバジン(PCZ) 100mg/m ² /日	経口	mg						
(支持療法)								
A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	○ を mg	↑	↑		4週を1コースとして繰り返す	↑	

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①エンドキサン(CPA)	100mg	生食 250ml	60分/点滴
	500mg		
②オンコビン(VCR)	1mg	生食 50ml	5分/点滴
③ アロキシ(0.75) または グラニセトロン(1)	0.75mg	生食 100ml	15分/点滴
	1mg		
④KN3号	500mL		メインルート/点滴

投与間隔≫ (メインルート) (15分/側管) (5分/側管) (60分/側管)

投与順番≫ ④ → ③ → ② → ① → 終了

【備考】

※1 プレドニゾロンは1、4コース目のみ
