

| | | | |
|--------|------|----------|----------------------|
| レジメン番号 | 0256 | レジメン名 | アバスチン+DC |
| 登録診療科 | 婦人科 | 使用薬剤 | アバスチン、ドセタキセル、カルボプラチン |
| がん腫 | 卵巣癌 | インターバル日数 | 21日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | …Day21 | Day1 (/) |
|---------------------------------------|------|-------|---------------|----------|---------------|
| アバスチン (Bev) 15mg/kg | 点滴 | mg | ↓ | 3週間を1コース | ↓ |
| カルボプラチン (CBDCA) (AUC=5: Calvert 式) | 点滴 | mg | ↓ | | ↓ |
| ドセタキセル (DTX) 70mg/m ² | 点滴 | mg | ↓ | | ↓ |

(支持療法)

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|---|----------|---|
| デキサート 9.9mg/body | 点滴 | 9.9 mg | ↑ | 3週間を1コース | ↑ |
| A) アロキシ (0.75) B) グラニセトロン (1) | 点滴 | ○ を mg | ↑ | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|-------------------------------|--------|----------|----------|
| ①アバスチン | 100mg | 生食 100mL | ※下記参照/点滴 |
| | 400mg | | |
| ②カルボプラチン | 50mg | 生食 250mL | 60分/点滴 |
| | 150mg | | |
| ③ドセタキセル | 20mg | 生食 250mL | 60分/点滴 |
| | 80mg | | |
| ④ デキサート アロキシ グラニセトロン | 3.3mg | 生食 100mL | 15分/点滴 |
| | 0.75mg | | |
| | 1mg | | |
| ⑤ 生食 | 50mL | | 5分/点滴 |

投与間隔> (※下記参照) (15分) (60分) (60分) (5分)
 投与順番> ① → ④ → ③ → ② → ⑤ → 終了

【備考】

※アバスチン投与速度：初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分で投与可能。