

レジメン番号	0269	レジメン名	頸癌アバスチン+TC
登録診療科	婦人科	使用薬剤	アバスチン、パクリタキセル、カルボプラチン
がん腫	子宮頸癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
アバスチン(Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
パクリタキセル(PTX) 175mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=5: Calvert式)	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

デキサート 19.8mg/body	点滴	19.8mg	↑	3週間を1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑
A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	を mg	↑		↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	150mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①アバスチン	100mg	生食 100mL	※下記参照/点滴
	400mg		
②パクリタキセル	30mg	生食 500mL	3時間/点滴
	100mg		
③カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
④プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴
⑤	デキサート	生食 100mL	15分/点滴
	ファモチジン		
	ネオレスタール		
⑥	アロキシ	生食 100mL	30分/点滴
	または グラニセトロン		
⑦生食	50mL		5分/点滴
⑧生食	50mL		5分/点滴

投与
間隔>> (※下記参照) (30分) (15分) (30分) (5分) (3時間) (60分) (5分)

投与
順番>> ① → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑧ → ② → ③ → ⑦ → 終了

【備考】

※アバスチン投与速度：初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分で投与可能。

④プロイメンド：内服イメンド (day1 125mg、day2以降80mg) 使用の場合は投与しない