レジメン番号	0090	レジメン名	CDDP+PEM+(放射線)
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	シスプラチン、ペメトレキセド
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	• • 21	Day1 (/)
ペメトレキセド (PEM) 500mg/㎡	点滴	mg	\downarrow		→
シスプラチン (CDDP) 75mg/㎡	点滴	mg	\downarrow	3 週間を 1 コース	\

(支持療法)

A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑		1
デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	\uparrow	3 週間を 1 コース	1
硫酸マグネシウム 0.5A/body	点滴	0.5A	↑		1
マンニットール 200mL/body	点滴	200mL	↑		1

【当日の投与方法】

	薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法		
① ペメトレキセド			100mg	生会 100…I	10 分/点滴		
	ベストレイピト		500mg	生食 100mL	10 万/总值		
			10mg		60 分/点滴		
2	シスプラチン		25mg	生食 500mL			
			50mg				
	アロキシ ③ グラニセトロン またり		0.75mg				
3			1mg	生食 100mL	15 分/点滴		
	デキサート		3.3mg				
4	硫酸マグネシウム			生食 500mL	60 分/点滴		
5	マンニットール		200mL		30 分/点滴		
6	⑥ 生食		500mL		60 分/点滴		

投与間隔≫		(15分)		(10分)		(60分)		(30分)		(60分)		(60分)	
投与順番≫	3	→	1	\longrightarrow	4	→	5	\longrightarrow	2	→	6	>	終了

【コメント】

放射線とシスプラチン+ペメトレキセド併用後、ペメトレキセド単剤を実施。