| レジメン番号 | 0102 | レジメン名 | PEM+ペムブロリズマブ |
|---|---|---|---|
| 登録診療科 | 呼吸器内科 | 使用薬剤 | ペメトレキセド、キイトルーダ |
| がん腫 | 非小細胞肺癌 | インターバル日数 | 21 日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名<br>投与量／体表面積 | 投与<br>方法 | 患者投与量 | Day1<br>( / ) | ‥Day21 | Day1<br>( / ) |
|---|---|---|---|---|---|
| キイトルーダ<br>200mg/body | 点滴 | mg | ↓ | 3 週間を 1 コース | ↓ |
| ペメトレキセド(PEM)<br>500mg/㎡ | 点滴 | mg | ↓ | | ↓ |

（支持療法）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| グラニセトロン<br>1mg/body | 点滴 | mg | ↑ | 3 週間を 1 コース | ↑ |
| デキサート<br>6.6mg/body | 点滴 | mg | ↑ | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|---|---|---|---|---|
| ①キイトルーダ | | 100mg | 生食 100mL | 30 分/点滴 |
| ②ペメトレキセド | | 100mg<br>500mg | 生食 100mL | 10 分/点滴 |
| ③ | グラニセトロン | 1mg | 生食 100mL | 15 分/点滴 |
| | デキサート | 3.3mg | | |
| ④ | 生食 | 100mL | | 15 分/点滴 |
| ⑤ | 生食 | 50mL | | 5 分/点滴 |
| ⑥ | 生食 | 50mL | | 5 分/点滴 |

投与時間≫ (15 分) (30 分) (5 分) (15 分) (10 分) (5 分)

投与順≫ ④ → ① → ⑤ → ③ → ② → ⑥ → 終了

【備考】