レジメン番号	0359	レジメン名	CBDCA+PEM+ニボ+イピ
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチン、ペメトレキセド、 オプジーボ、ヤーボイ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	42 日

【投与量・投与スケジュール】

							ъ .
薬品名	投与	患者投与量	Day1	Day22		\cdots Day42	Day1
投与量/体表面積	方法		(/)	(/)			(/)
オプジーボ 点滴							1
360mg/body	小個	mg	\	\			\
ヤーボイ	点滴						1
1mg/kg	尽何	mg	\			6 週間を 1 コース	V
ペメトレキセド(PEM)	点滴					6 週间を 1 コース	
$500 \mathrm{mg/m^2}$	尽何	mg	\	\			V
カルボプラチン(CBDCA)) abc					1
(AUC=6: Calvert 式)	点滴	mg	↓	\			↓
(支持療法)							
アロキシ	点滴			↑			^
0.75mg/body	尽何	mg					l
デキサート 9.9mg/body		mg	1			6 週間を 1 コース	^
						0 福田で 1 一 ハ	
プロイメンド	プロイメンド 点滴		n ↑	↑			<u></u>
150mg/body	小個	mg	1				

【当日の投与方法】

П ()1)	(子)[伝]				
薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法	
①オプジーボ		120mg 240mg	生食 100mL	30 分/点滴	
②ヤーボイ		50mg	生食 100mL	30 分/点滴	
3~.	メトレキセド	100mg 500mg	生食 100mL	10 分/点滴	
④ カル	レボプラチン	50mg 150mg	生食 250mL	60 分/点滴	
⑤	アロキシ デキサート	0.75mg 3.3mg	生食 100mL	15 分/点滴	
6	生食	100mL		15 分/点滴	
7	生食	100mL		30 分/点滴	
8	生食	100mL		30 分/点滴	
9	生食	50mL		5 分/点滴	
10	プロイメンド	150mg	生食 250mL	30 分/点滴	

≪Day1≫

投与間隔》 $(15 \, \%)$ $(30 \, \%)$ $(30 \, \%)$ $(30 \, \%)$ $(30 \, \%)$ $(30 \, \%)$ $(30 \, \%)$ 投与順番》6 \longrightarrow 1 \longrightarrow 7 \longrightarrow 2 \longrightarrow 8 \longrightarrow 10 \longrightarrow

≪Day22≫

投与間隔 \gg (30 分) (30 分) (30 分) (15 分) (60 分) (5 分)

【備考】

⑩プロイメンド: 内服イメンド (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない。