

レジメン番号	0373	レジメン名	Nivo+SOX
登録診療科	消化器外科	使用薬剤	オプジーボ、エスワンタイハウ、 エルプラット
がん腫	胃癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	2~14	…Day21	Day1 (/)
オプジーボ 360mg/body	点滴	mg	↓		3週1コース	↓
エルプラット (I-OHP) 130mg/m ²	点滴	mg	↓			↓
エスワンタイハウ ※1 下記参照	内服	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	○ を mg	↑			↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① オプジーボ	240mg	生食 100mL	30分/点滴
	120mg		
② エルプラット デキサート	100mg	5%Tz500mL	120分/点滴
	1.65mg		
③ アロキシ または グラニセトロン デキサート	0.75mg	5%Tz100mL	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg 1.65mg		
④ 生食	100ml		15分/点滴
⑤ 生食	50ml		5分/点滴
⑥ 生食	50ml		15分/点滴

投与間隔≫ (15分) (30分) (5分) (15分) (120分) (15分)

投与順番≫ ④ → ① → ⑤ → ③ → ② → ⑥ → 終了

【備考】

S-1 内服を Day1~Day14 に併用 (2週服薬 1週休薬)

※ S-1 投与量 : BSA 1.25 m²未満 → 80mg/day

BSA 1.25 m²~1.5 m²未満 → 100mg/day

BSA 1.5 m²以上 → 120mg/day