


|        |       |          |   |
|--------|-------|----------|---|
| レジメン番号 | 0374  | レジメン名    | Nivo+FOLFOX                                 |
| 登録診療科  | 消化器外科 | 使用薬剤     | オプジーボ <sup>®</sup> 、レボホリナート、フルオロウラシル、エルプラット |
| がん腫    | 胃癌    | インターバル日数 | 14日   |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名<br>投与量/体表面積                          | 投与方法 | 患者投与量 | Day1<br>( / ) | …Day14   | Day1<br>( / ) |
|--|------|-------|---------------|----------|---------------|
| オプジーボ<br>240mg/body                      | 点滴   | mg    | ↓             | 2週間を1コース | ↓             |
| レボホリナート(1-LV)<br>200mg/ m <sup>2</sup>   | 点滴   | mg    | ↓             |          | ↓             |
| フルオロウラシル (5FU)<br>400mg/ m <sup>2</sup>  | 点滴   | mg    | ↓             |          | ↓             |
| エルプラット(L-OHP)<br>85mg/ m <sup>2</sup>    | 点滴   | mg    | ↓             |          | ↓             |
| フルオロウラシル (5FU)<br>2400mg/ m <sup>2</sup> | 持続注入 | mg    | ↓             |          | ↓             |

(支持療法)

|                                |    |   |   |          |   |
|--------------------------------|----|---|---|----------|---|
| A) アロキシ(0.75)<br>B) グラニセトロン(1) | 点滴 |  | ↑ | 2週間を1コース | ↑ |
| デキサート<br>6.6mg/body            | 点滴 | 6.6mg   | ↑ |          | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名                               | 規格     | 希釈液/量  | 投与速度/方法   |
|-----------------------------------|--------|--|-----------|
| ① オプジーボ                           | 240mg  | 生食 100mL   | 30分/点滴    |
| ② レボホリナート                         | 25mg   | 5%ブドウ糖液 250mL  | 120分/点滴   |
|                                   | 100mg  |  |           |
| ③ bolus フルオロウラシル                  | 250mg  | 5%ブドウ糖液 100mL  | 5分/点滴     |
|                                   | 1000mg |  |           |
| ④ フルオロウラシル                        | 250mg  | 生食適量   | 46hr 持続注入 |
|                                   | 1000mg |  |           |
| ⑤ エルプラット                          | 100mg  | 5%ブドウ糖液 250mL  | 120分/点滴   |
| ⑥ アロキシ<br>または<br>グラニセトロン<br>デキサート | 0.75mg | 5%ブドウ糖液 100mL  | 30分/点滴    |
|                                   | 1mg    |  |           |
|                                   | 3.3mg  |  |           |
| ⑦ 生食                              | 100ml  |  | 15分/点滴    |
| ⑧ 生食                              | 50ml   |  | 5分/点滴     |

投与間隔≫ (15分) (30分) (5分) (30分) ② (120分) (5分) 46時間 (持続注入)

投与順番≫ ⑦ → ① → ⑧ → ⑥ → ⑤ → ③ → ④ → 終了

【コメント】

-----

-----

-----