

レジメン番号	0376	レジメン名	Cetuximab+BRAF+MEK
登録診療科	外科	使用薬剤	アービタックス、ビラフトビ メクトビ
がん腫	大腸癌	インターバル日数	7日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day7	Day1 (/)
アービタックス (Cetuximab) 初回 400mg/ m ² 以後 250mg/ m ²	点滴	mg	↓	1週間隔で投与を継続	↓
ビラフトビ 300mg/日	内服	mg	↓	↓	↓
メクトビ 90mg/日	内服	mg	↓↓	↓↓	↓↓

(支持療法)

デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①アービタックス	100mg	生食 250mL	下記参照/点滴
②	デキサート	生食 100ml	15分/点滴
	ネオレスタール		
③	生食	生食 100ml	30分/点滴
④	生食	生食 100ml	下記参照/点滴

投与間隔> (15分) (30分) (下記参照) (下記参照)
 投与順番> ② → ③ → ① → ④ → 終了

【備考】

・ビラフトビ 1日1回 300mg 連日内服

・メクトビ 1日2回 45mg/回 連日内服 (※メクトビはなしでも可)

①アービタックス 初回 120分/2回目以降 60分

アービタックス投与終了後の生食④の投与時間

初回 60分/2回目以降 15分