

レジメン番号	0383	レジメン名	Isa d 療法 初回サイクル
登録診療科	血液・腫瘍内科	使用薬剤	サークリサ、デキサート
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	Day22 (/)	…Day28	Day1 (/)
サークリサ 20mg/kg	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	4 週間を 1 コース	↓
デキサート 40mg/body ※1	点滴	mg	↓	↓	↓	↓		↓

(支持療法)

※2 Day1 経口剤あり

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① サークリサ	100mg	生食 総量 250mL に調製	※3 下記参照/輸注ポンプ
	500mg		
② デキサート	3.3mg	生食 100ml	15 分/点滴
③ 生食	50mL		5 分/点滴
④ 生食	250ml		メインルート/点滴 50ml/h

投与間隔>

(メインルート/持続)

(側管 15 分)

(側管※3)

(5 分)

投与順番>

④

→

②

→

①

→

③

→

終了

【コメント】

※1 必要に応じて内服へ変更可。75 歳以上は 20 mg/回に減量。

※2 サークリサ投与 15～60 分前に、解熱鎮痛剤 (アセトアミノフェン 1000mg)、抗ヒスタミン剤、H2 受容体拮抗剤の予防投与を行う。

※3 サークリサ投与速度 別紙「サークリサ点滴速度換算表」を参照。