

レジメン番号	0384	レジメン名	Isa d療法 2サイクル以降
登録診療科	血液・腫瘍内科	使用薬剤	サークリサ、デキサート
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day8 ( / )	Day15 ( / )	Day22 ( / )	…Day28	Day1 ( / )
サークリサ 20mg/kg	点滴	mg	↓		↓		4週間を 1コース	↓
デキサート 40mg/body ※1	点滴	mg	↓		↓			↓
レナデックス 40mg/body ※2	経口	mg		↓		↓		

(支持療法)

※3 Day1 経口剤あり

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① サークリサ	100mg	生食 総量 250mL に調製	※3 下記参照/輸注ポンプ
	500mg		
② デキサート	3.3mg	生食 100ml	15分/点滴
③ 生食	50mL		5分/点滴
④ 生食	250ml		メインルート/点滴 50ml/h

投与間隔>

(メインルート/持続)

(側管 15分)

(側管※4)

(5分)

投与順番> ④ → ② → ① → ③ → 終了

【コメント】

※1 必要に応じて内服へ変更可。75歳以上は20mg/回に減量。

※2 75歳以上は20mg/回に減量。

※3 サークリサ投与15～60分前に、解熱鎮痛剤(アセトアミノフェン1000mg)、抗ヒスタミン剤、H2受容体拮抗剤の予防投与を行う。

※4 サークリサ投与速度 別紙「サークリサ点滴速度換算表」を参照。