

レジメン番号	0399	レジメン名	レミトロ
登録診療科	血液・腫瘍内科	使用薬剤	レミトロ
がん腫	末梢性 T 細胞リンパ腫、 皮膚 T 細胞性リンパ腫	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	Day4 (/)	Day5 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
レミトロ 9 μg/kg/日	点滴	μg	↓	↓	↓	↓	↓	3 週 1 コース	↓

(支持療法)

デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6 mg	↑	↑	↑	↑	↑	3 週 1 コース	↑
---------------------	----	--------	---	---	---	---	---	-----------	---

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①レミトロ	300 μg	生食 100mL (1Vあたり注射用水 2.1ml で溶解)	60 分/点滴
②デキサート	3.3mg	生食 100mL	15 分/点滴
③生食	250mL		60 分/点滴
④生食	250mL		60 分/点滴

投与間隔>> (メインルート/持続) (側管 15 分) (側管 60 分) (側管 60 分) (側管 60 分)

投与順番>> ⑤ → ② → ③ → ① → ④ → 終了

【備考】

⑤メインルート：生食 250ml 50mL/h

レミトロ開始 30 分前に、クロルフェニラミン錠 6mg, アセトアミノフェン錠 500mg を服用

最大 8 サイクルまで