

レジメン番号	0397	レジメン名	CDDP+ETP
登録診療科		使用薬剤	シスプラチン、エトポシド
がん腫	神経内分泌癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
エトポシド (VP-16) 100mg/m ² /日	点滴	mg	↓	↓	↓	3週1コース	↓
シスプラチン (CDDP) 80mg/m ² /日	点滴	mg	↓				↓

(支持療法)

薬品名	投与方法	患者投与量	Day1	Day2	Day3	・・・Day21	Day1
デキサート (day1) 9.9mg/body (day8) 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑	3週間1コース	↑
パロノセトロン 0.75mg	点滴	mg	↑				↑
硫酸マグネシウム 0.4A/body	点滴	A	↑				↑
マンニトール 200mL/body	点滴	mL	↑				↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	mg	↑				↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法	
①エトポシド	100mg	生食 500mL	90分/点滴	
②シスプラチン	10mg	生食 500mL	60分/点滴	
	25mg			
	50mg			
③	パロノセトロン	0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	デキサート(day1)	3.3mg		
	デキサート(day2・3)	3.3mg		
④	硫酸マグネシウム	生食 500mL	60分/点滴	
⑤	プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴
⑥	マンニトール	300mL		30分/点滴
⑦	生食	500mL		60分/点滴
⑧	生食	50mL		5分/点滴

(day1)

投与間隔>> (30分) (15分) (90分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順番>> ⑤ → ③ → ① → ④ → ⑥ → ② → ⑦ → 終了

(day2・3)

投与間隔>> (15分) (90分) (5分)

投与順番>> ③ → ① → ⑧ → 終了

【備考】

⑤プロイメンド：内服イメンド (day1 125mg、day2以降 80mg) 使用の場合は投与しない