

レジメン番号	0428	レジメン名	Isa Kd 療法 初回サイクル
登録診療科	血液・腫瘍内科	使用薬剤	カイプロリス、サークリサ、デキサート/レナデックス
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 ( / )	Day2 ( / )	Day8 ( / )	Day9 ( / )	Day15 ( / )	Day16 ( / )	Day22 ( / )	Day23 ( / )	…Day28
カイプロリス 20mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓							4 週間を 1 コース
カイプロリス 56mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg			↓	↓	↓	↓			
サークリサ 10mg/kg	点滴	mg	↓		↓		↓		↓		
デキサート 20mg/body ※1	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
レナデックス 20mg/body (支持療法)	内服	mg								↓	

(支持療法)

※2 Day1 経口剤あり

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① カイプロリス	10mg	5%ブドウ糖 100mL (10mg は 1V5ml、40mg は 1V20ml 注射用水で溶解)	30 分/点滴
	40mg		
② サークリサ	100mg	生食 総量 250mL に調製	※3 下記参照/輸注ポンプ
	500mg		
③ デキサート	3.3mg	5%ブドウ糖 100ml	15 分/点滴
④ 生食	50mL		5 分/点滴
⑤ 5%ブドウ糖	250mL		メインルート/点滴 50mL/h
⑥ 5%ブドウ糖	100mL		メインルート/点滴 50mL/h

《Day1,8,15》

投与間隔> (メインルート/持続) (15分) (30分) (※) (5分)

投与順番> ⑤ → ③ → ① → ② → ④ → 終了

《Day2,9,16》

投与間隔> (メインルート/持続) (15分) (30分) (5分)

投与順番> ⑥ → ③ → ① → ④ → 終了

《Day22》

投与間隔> (メインルート/持続) (15分) (※) (5分)

投与順番> ⑤ → ③ → ② → ④ → 終了

【コメント】

※1 必要に応じて内服へ変更可。

※2 サークリサ投与 15～60 分前に、解熱鎮痛剤(アセトアミノフェン 1000mg)、抗ヒスタミン剤、H2 受容体拮抗剤の  
予防投与を行う。

※3 サークリサ投与速度 別紙「サークリサ点滴速度換算表」を参照。

Day23 のレナデックスは必要に応じて点滴へ変更可。