

レジメン番号	0408	レジメン名	CBDCA+PEM+トレ+デュル(≦30kg)Ad
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチン、ペメトレキセド、イジユド、イミフィンジ
がん腫	非扁平上皮非小細胞肺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
イジユド 75mg/body	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
イミフィンジ 20mg/kg	点滴	mg	↓		↓
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=6: Calvert式)	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	mg	↑	3週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①イジユド	25mg	生食 100mL	60分/点滴
②イミフィンジ	120mg	生食 100mL	60分/点滴
	500mg		
③ペメトレキセド	100mg	生食 100mL	10分/点滴
	500mg		
④カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
⑤	パロノセトロン 0.75mg	生食 100mL	※15分/点滴
	デキサート 3.3mg		
⑥ 生食	100mL		15分/点滴
⑦ 生食	100mL		30分/点滴
⑧ 生食	100mL		30分/点滴
⑨ 生食	50mL		5分/点滴

投与
間隔≫ (15分) (60分) (30分) (60分) (30分) ※ (15分) (10分) (60分) (5分)
投与
順番≫ ⑥ → ① → ⑦ → ② → ⑧ → ⑤ → ③ → ④ → ⑨ → 終了

【備考】

・内服イメンドカプセル (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合、アロカリスは使用しない

※アロカリス使用の場合は⑤に混合し、投与時間は30分

・最大4コース